Lu 1.r le 28 7bre 1780

N° 31

Ouverture de Cadavre, à l'ocassion d'un annevrisme de L'aorte.

Le nommé Lafrance postillon agé denviron 49 ans fit une chute de cheval et tomba sur le coté gauche au mois de 7bre 1778. Cette chute fut suivie de douleur et de difficulté de respirer du meme coté. mr. Lacoste chirurgien ordin.re de mgr. Le conte Dartois fut appellé, le saigna 4. à 5. fois en peu de temps, le mit à la diette et appliqua sur le coté des topiques spiriteux et un bandage de corps; Les accidents diminuerent le malade garda seulement le bandage de corps et reprit ses fonctions; Il ressentoit neanmoins quelques douleurs au dos vers langle de lomoplatte du meme coté, mr. Lacoste les attribua à des douleurs rhumatisantes auxquelles le malade etoit sujet depuis long temps; Il perdit le malade de vüe etant sorti de la maison ou il restoit, Mais qu'il avoit apris que neuf mois apres sa chute, qu'on avoit appereu une petite tumeur audessous, de l'angle inferieur de l'omoplatte gauche que s'etant adressé à un chirurgien suisse qui la traité pend.t long temps sans aucun succés, Enfin la tumeur à toujours eté en augmentant particulierem.t les derniers six mois de sa vie, Elle avoit acquis la grosseur d'un pain d'une livre en rond, Le malade avoit une difficulté de respirer trés laborieuse, ne pouvant respirer qu'en se couchant sur le ventre, Il est mort le 27. de Juillet 1780. 22. mois aprés sa chute. mr. Sauvau chirurgien qui avoit vü le malade quelques jours avant la mort ~~du malade~~, Nous Invita, m.rs Peyret, Berdolin et moi. avec mr. Lacoste d'etre presens à l'ouverture du corps.

Nous y procedames en commencant par ouvrir les teguments qui recouvroient la tumeur anevrismalle, les teguments etoient fort pateux et tout le contour de la tumeur etoit ecchymosée, Et l'on sentoit une fluctuation sensible... Aprés avoir penetré dans l'interieur de la tumeur anevrismalle, d'ou il sortit une grande

ARCS4 n° 53

quantité de sang: Nous fimes mettre le cadavre sur le dos
pour ouvrir les muscles du bas ventre, afin de bien —
découvrir le siege de l'anevrisme, Nous trouvames entre
la 6e. et la 7e. des vrais cotes du coté gauche, que l'aorte
formoit le sac anevrismal d'un volume considerable
et tel comme nous l'avons presenté à la seeance du 31. Juillet.
Il n'y avoit point d'epanchement dans la capacité, Le sac
anevrismal etoit fort epais et rempli de beaucoup de sang
grumelé,

Voici la description de la piece anatomique, D'apres —
„ l'examen de mr. Levether. „ L'artere aorte ouverte dans sa
„ partie lateralle gauche et posterieure: Cette ouverture dont
„ les bords n'etoient pas lisses, ainsi que cela à lieu ordinairement
„ avait deux pouces ½ d'etendue de haut en bas et pres d'un
„ pouce transversallemt.; la Crevasse repondoit à la 6e. 7e. et
„ 8e. vertebre dorsale, La surface anterieure de cette artere
„ n'est point dilatée; des parties lateralles, partent deux
„ prolongemts qui, formoient les parois de la tumeur,
„ le droit etoit fixé à la partie laterale droite du corps de —
„ la 5e. vertebre et s'etendoit jusqu'à la 9e.: le gauche avait
„ la meme étendue relativemt. à l'aorte, mais il etoit plus —
„ évasé plus dilaté que l'autre; Les prolongemts. etoient —
„ recouverts par la plevre, il n'y avoit aucune ouverture
„ du coté droit, mais le sac gauche etoit ouvert posterieuremt.

„ La Surface anterieure du corps de la 5e. 6e. 7e. 8e. et 9e.
„ vertebre dorsale etait corrodée de la profondeur de quelques
„ lignes. La partie laterale gauche de ces mêmes vertebres —
„ detruite en grande partie. Le canal vertebral dans l'espace
„ de la 7e. à la 9e. vertebre dorsale est detruit et l'on appercoit
„ la moüelle epiniere.
„ toutes les vertebres dont nous avons parlé, sont noires dans
„ les endroits affectés; ressemblant aux os sur lesquels on à appliqué
„ le cautere actuel.

„ , L'extremité posterieure de la 6e. 7e. et 9e. vraie coté est —
„ egalement noire et en partie detruite, Celle de la 8e. n'existe plus.

Quoi-que le detail de pareilles maladies, n'offrent que bien peu de resourses pour le Salut du malade, nous remarquerons cepend.t dans celle cy, que la marche de la tumeur anevrismalle, à fait en 22. mois un progrés bien rapide; On à vû des malades attaqués d'anevrisme de l'aorte, de la Souclaviere, de la Carotide, &c. dont les malades ont vecu plusieurs années; J'en ai vû deux, l'un affecté d'un anevrisme de la Crosse de l'aorte dont la tumeur etoit du volume d'une grosse pomme de rainette, Situeé à côté du Sternum, le malade à vecu cinq à Six ans, L'autre une anevrisme de la Carotide du côté gauche qui à vecu plusieurs années; Ce qui nous fait prèsumer que la vitesse, et sa progression de la tumeur anevrismale du nommé Lafrance, auroit pû être retardées, Si on eut connu plus-tot la nature de Sa Maladie.

En concluant que de pareils anevrismes des gros vaisseaux, Sont necesserement mortels: Nous croions neanmoins que l'art peut en retarder les progres et prolonger les jours de Ses malheureuses victimes, en emploiant frequament les Saignées, En preserivant un regime fort exact, particulierem.t des legumes, des Boissons acidulées dans les chaleurs: aux Malades dont la poitrine est delicate, l'usage du lait coupé, Les bouillons adoucissants, les bechiques, Enfin la Suspension en tout genre, de tout exercice violent; telle est la pratique que j'ai mis en usage dans le peu de cas que j'ai eu a traiter en ce genre.

Delaporte

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE